

Acceem

BIOINSECTICIDA - ACARICIDA

DATOS GENERALES

| | |
|--|------|
| Extracto de neem, aceite esencial de canela y aceite esencial de naranja | 60% |
| Excipiente C.B.P. | 40% |
| | 100% |



Acceem es un producto de origen natural elaborado a base de extracto oleoso de neem, potencializado con aceite esencial de canela. Tiene acción de contacto y efecto repelente y antialimentario, es fuertemente irritante contra ácaros e insectos de cuerpo blando.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel y ojos, lavarse con suficiente agua limpia. Si el producto ha sido ingerido, no provocar el vómito ni administrar medicamentos hasta que sea revisado por el médico, quien deberá leer la etiqueta. Cámbiese inmediatamente la ropa contaminada.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Este es un producto inocuo para humanos, fauna y medio ambiente en general. Sin embargo, se recomienda seguir las medidas de cuidado para el plaguicida con el que se mezcla. No contaminar el suelo ni depósitos y corrientes de agua. No reutilice este envase, devuélvalo al proveedor o envíelo a un centro de acopio de envases plaguicidas.

TRANSPORTE

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas, ropa o forraje. Manténgase en su envase original bien cerrado y etiquetado. Almacene a temperatura ambiente (40°C máximo), en un lugar ventilado, sombreado y retirado del fuego o fuentes de calor.

GARANTÍA

Se garantiza el contenido neto y la concentración expresada en la etiqueta, el fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los daños causados por manejo inadecuado o como resultado de condiciones climáticas adversas.

INSTRUCCIONES DE USO

| CULTIVOS | DOSIS FOLIAR |
|--|----------------|
| Brócoli, Lechuga, Coliflor, Col de bruselas y Repollo | 5 mL/L de agua |
| Chile, Jitomate, Chile bell, Berenjena, Tomate de cáscara y Papa | |
| Fresa, Frambuesa, Arándano y Zarzamora | |
| Plátano, Papaya, Mango, Café, Cacao, Piña y Tabaco | |
| Maíz, Frijol, Soya, Trigo, Avena, Sorgo y Girasol | |
| Rábano, Espárrago, Zanahoria y Remolacha | |
| Pepino, Calabaza, Melón y Sandía | |
| Aguacate, Manzana, Pera, Durazno, Olivo y Nogal | |
| Albahaca, Menta, Tomillo, Chicharo y Orégano | |
| Cilantro, Apio, Salvia, Romero y Estevia | |
| Algodón y Ornamental | |
| Ajo y Cebolla | |
| Vid | |
| Cítricos | |
| Cacahuete | |

El intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha es: Sin límite.

Horas de reentrada al área tratada: Una vez que seque el producto (4 horas).

Por ser un producto de contacto y de bajo impacto ambiental, se considera un producto noble para la fauna, sin embargo por ser un producto de contacto es conveniente resguardar abejorros (en caso de tener).

RECOMENDACIONES DE USO

Utilice la dosis baja para infestaciones tempranas. Se recomienda utilizar 200 a 300 L de agua/Ha. en aplicaciones terrestres.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es Fitotóxico si se aplica en las dosis y de la manera aquí recomendadas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y nutrientes foliares. Utilice siempre el equipo de protección recomendado.

