

## Trihar

Trichoderma Harzianum  
FUNGICIDA AGRÍCOLA

### DATOS GENERALES

Trichoderma Harzianum <i>Equivalente a 100 gde i.a./Kg, con una concentración de 1X10<sup>8</sup> conidios/g.</i>	10%
Ingrediente de interes: Soporte	90%
	100%

RSCO-FUNG-0301B-0612-002-10.0

**Trihar** es un fungicida de origen microbioal que actúa por ingestión y contacto. Se recomienda para aplicación foliar en los cultivos y para las plagas aquí indicadas.

### PRIMEROS AUXILIOS

Aleje a la persona del área contaminada. Si el producto entra en contacto con los ojos, lave con agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si entra en contacto con la piel lavar las partes afectadas. Si se persiste la irritación o las molestias, consulte a su médico.

### RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: Hongo trichoderma harzianum.

Sintomas de intoxicación: No se conoce intoxicación por este hongo entomopatógeno.

### PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Este es un producto inocuo para humanos, fauna y medio ambiente en general. Sin embargo, se recomienda seguir las medidas de cuidado para el plaguicida con el que se mezcla. No contaminar el suelo ni depósitos y corrientes de agua. No reutilice este envase, devuélvalo al proveedor o envíelo a un centro de acopio de envases plaguicidas.

### TRANSPORTE

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas, ropa o forraje. Manténgase en su envase original bien cerrado y etiquetado. Almacene a temperatura ambiente (40°C máximo), en un lugar ventilado, sombreado y retirado del fuego o fuentes de calor.

### GARANTÍA

Se garantiza el contenido neto y la concentración expresada en la etiqueta, el fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los daños causados por manejo inadecuado o como resultado de condiciones climáticas adversas.

### INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	INTERVALO DE SEGURIDAD	PLAGA	DOSIS Kg/Ha.	OBSERVACIONES
Jitomate Chile Chile Bell Berenjena Tomate de Cáscara Papa Tabaco	SIN LÍMITE	Marchitez del Tomate (Fusarium oxysporum f.sp lycopersici)	0.5-0.6 Kg/Ha.	Realizar dos aplicaciones de Trihar al sistema de riego por goteo a intervalos de 7 días. En tratamiento de semilla aplicar una dosis por cada 100 kilogramos de semilla.

### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

No coma, tome o fume cuando este utilizando este producto. No se transporte ni se almacene juntos a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera de alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos. Lávese las manos después de usar el producto y antes de consumir alimentos. No almacene en casa habitación. No use el producto sin el equipo de protección adecuado. Los menores de 18 años no deberán usar este producto. Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia. No se ingiera, inhale y evite el contacto con los ojos y piel. No mezcle o prepare el producto, use guantes. No destape la boquilla con la boca.

El intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entra la última aplicación y la cosecha es: Sin límite.

### CONTRAINDICACIONES

No se aplica en horas de calor intenso, ni cuando haya vientos de mayores a los 10 Km/h, ni cuando se pronostique lluvias dentro de las 4 horas después de la aplicación. Realice las aplicaciones a favor del viento. **Trihar** no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y nutrientes foliares. Utilice siempre el equipo de protección recomendado.

Titular del registro y distribuidor:  
**Ángel Salgado Mejía**  
Nuño Beltrán de Guzman No. 4715  
Col. Acueducto, C.P. 80056, Culiacán  
de Rosales, Sinaloa, México.  
Tel./Fax 01 (667) 350-080