

FICHA TÉCNICA

Categoría: Extractos Vegetales



Concentrajo

REPELENTE DE AJO
ORGÁNICO

DATOS GENERALES

Aceite esencial de Ajo (Allium sativum)	4%
Excipiente C.B.P.	96%
	100%



Fertilizantes e Insumos
Agrícolas, S.A. de C.V.
Av. Del Dren #7852 Sur,
Col. Argentina II, Campo Diez,
Culiacán, Sin., México. C.P. 80396.
Teléfono: +52 (667) 717 1245

Concentrajo es un producto orgánico elaborado a base de Ajo, con acción repelente sobre los insectos que afectan los cultivos. No requiere equipo de protección especial durante las maniobras de transporte y almacenamiento. Al utilizarse en mezcla con otros productos, se recomienda seguir las instrucciones de manejo para dichos productos. Proteger los ojos con gafas y las manos con guantes de hule.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel y ojos, lavarse con suficiente agua limpia. Si el producto ha sido ingerido, no provocar el vómito ni administrar medicamentos hasta que sea revisado por el médico, quien deberá leer la etiqueta. Cámbiese inmediatamente la ropa contaminada.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Este es un producto inocuo para humanos, fauna y medio ambiente en general, sin embargo, se recomienda seguir las medidas de cuidado para el plaguicida con el que se mezcla. No contaminar el suelo ni depósitos y corrientes de agua. No reutilice este envase, devuélvalo al proveedor o envíelo a un centro de acopio de envases plaguicidas.

TRANSPORTE

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas, ropa o forraje. Manténgase en su envase original bien cerrado y etiquetado. Almacene a temperatura ambiente (40°C máximo), en un lugar ventilado, sombreado y retirado del fuego o fuentes de calor.

GARANTÍA

Se garantiza el contenido neto y la concentración expresada en la etiqueta, el fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los daños causados por manejo inadecuado o como resultado de condiciones climáticas adversas.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	INTERVALO DE SEGURIDAD	PLAGA	DOSIS (mL/L)	OBSERVACIONES
CALABAZA CALABACITA CHAYOTE MELÓN PEPINO SANDÍA	0 días	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	2 - 6	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando aparezcan los primeros individuos de la plaga.
BERENJENA CHILE JITOMATE OKRA PAPA PIMIENTO TOMATE VERDE	0 días	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	2 - 6	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando aparezcan los primeros individuos de la plaga.

El intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha es: Sin límite. Horas de reentrada al área tratada: Cuando seque el producto.

Por ser un producto de contacto y de bajo impacto ambiental, se considera un producto noble para la fauna, sin embargo, por ser un producto de contacto es conveniente resguardar abejorros (en caso de tener).

RECOMENDACIONES DE USO

La dosis se debe aplicar en la cantidad de agua suficiente para lograr una buena cobertura. Se recomienda utilizar boquillas de aspersión que produzcan gotas finas para lograr la cobertura adecuada.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es Fitotóxico si se aplica en las dosis y de la manera aquí recomendadas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y nutrientes foliares. Utilice siempre el equipo de protección recomendado.