

# FICHA TÉCNICA

Categoría: Extractos Vegetales



## Terratrina

INSECTICIDA - ACARICIDA

### DATOS GENERALES

Aceite extracto de <i>Tagetes erecta</i>	4.61%
Surfactante y Diluyentes	95.39%
	100%



Fertilizantes e Insumos  
Agrícolas, S.A. de C.V.  
Av. Del Dren #7852 Sur,  
Col. Argentina II, Campo Diez,  
Culiacán, Sin., México. C.P. 80396.  
Teléfono: +52 (667) 717 1245

**Terratrina** es un insecticida acaricida orgánico a base de aceite de extracto de *Tagetes*. Al estar en contacto con el insecto penetra y afecta al sistema nervioso por interferencia competitiva con las conductancias catiónicas en la capa lipídica de las células nerviosas, bloqueando así la transmisión del impulso nervioso por interacción con los canales de sodio, lo que conlleva la parálisis y muerte del insecto.

### PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel y ojos, lavarse con suficiente agua limpia. Si el producto ha sido ingerido, no provocar el vómito ni administrar medicamentos hasta que sea revisado por el médico, quien deberá leer la etiqueta. Cámbiese inmediatamente la ropa contaminada.

### PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Este es un producto inocuo para humanos, fauna y medio ambiente en general, sin embargo, se recomienda seguir las medidas de cuidado para el plaguicida con el que se mezcla. No contaminar el suelo ni depósitos y corrientes de agua. No reutilice este envase, devuélvalo al proveedor o envíelo a un centro de acopio de envases plaguicidas.

### TRANSPORTE

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas, ropa o forraje. Manténgase en su envase original bien cerrado y etiquetado. Almacene a temperatura ambiente (40°C máximo), en un lugar ventilado, sombreado y retirado del fuego o fuentes de calor.

### GARANTÍA

Se garantiza el contenido neto y la concentración expresada en la etiqueta, el fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los daños causados por manejo inadecuado o como resultado de condiciones climáticas adversas.

### INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/Ha)	INTERVALO DE SEGURIDAD
Berenjena, Chile, Jitomate, Okra, Papa, Pimiento Morrón y Tomate verde	Trips ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	1.0 - 3.0	0 días
Calabaza, Calabacita, Chayote, Melón, Pepino y Sandía	Trips ( <i>Frankliniella occidentalis</i> ) Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	1.0 - 3.0	0 días

El intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha es: Sin límite.

Horas de reentrada al área tratada: Cuando seque el producto.

Por ser un producto de contacto y de bajo impacto ambiental, se considera un producto noble para la fauna, sin embargo, por ser un producto de contacto es conveniente resguardar abejorros (en caso de tener).

### RECOMENDACIONES DE USO

Realizar aplicaciones con intervalos de 15 a 22 días para evitar poblaciones altas de plagas y así bajar las aplicaciones de plaguicidas, tiene un amplio rango de tolerancia en condiciones de acidez (pH de 3-7) sin embargo es recomendable acondicionar el pH de 5-5.5

### FITOTOXICIDAD

Este producto no es Fitotóxico si se aplica en las dosis y de la manera aquí recomendadas.

### COMPATIBILIDAD

**Terratrina** es compatible con la mayoría de los insecticidas y nutrientes foliares, pero se recomienda hacer una prueba antes de mezclarlos. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.